1916 — N° 16

BULLETIN

DE LA

SOCIÉTÉ ENTOMOLOGIQUE

DE FRANCE

FONDÉE LE 29 FÉVRIER 1832

RECONNUE COMME INSTITUTION D'UTILITÉ PUBLIQUE

PAR DÉCRET DU 23 AOÛT 1878

Natura maxime miranda
in minimis.

PARIS

AU SIÈGE DE LA SOCIÉTÉ

HOTEL DES SOCIÉTÉS SAVANTES

28, Rue Serpente, 28

1916

Le Bulletin paraît deux fois par mois.

Librairie de la Société entomologique de France.

Hôtel des Sociétés savantes, rue Serpente, 28

La Société dispose des ouvrages suivants :

(Le premier prix est pour les **membres** de la Société, le deuxième, pour les personnes étrangères à la Société.)

Annales *de la Société entomologique de France*, années 1843 à 1845, 1859 à 1870, 1872 à 1879 et 1883 à 1895. . . . . 12 et 15 fr.
Annales (années 1896 à 1914). . . . . 25 et 30 fr.
Tables *des Annales* (**1832-1860**), par A.-S. Paris . 2 et 3 fr.
Tables *des Annales, de* **1861** *à* **1880**, par E. Lefèvre. 10 et 12 fr
Tables *des Annales, de* **1881** *à* **1890**, par E. Lefèvre. 7,50 et 10 fr.
Bulletin *de la Société entomologique de France* (publication distincte des *Annales*, depuis 1896), années 1896 à 1915, chaque année . . . . . 18 fr.
Bulletin (numéros isolés), chaque. . . . . 1 et 1 fr.
Bulletin, comptes rendus du Congrès (1 ou plus. N^os^). 5 et 5 fr.
L'Abeille (série in-12), la plupart des volumes, chacun. 8 et 12 fr.
L'Abeille (série in-8°), 1892-1906, prix de l'abonnement *par volume* (port compris). . . . . 10 et 12 fr.
Faune *des Coléoptères du bassin de la Seine*, par L. Bedel :
Vol. I (*Carnivora, Palpicornia*) . . . . . (*Épuisé.*)
Vol. II (*Staphylinoidea*, 1re part.) (par J. Ste-Claire Deville). . . . . 3 et 4 fr.
Vol. IV, 1er fascicule (*Scarabaeidae*) . . . . . 4 et 5 fr.
Vol. V (*Phytophaga*). . . . . 8 et 10 fr.
1er fascicule seul. . . . . 3 et 4 fr.
2e fascicule seul. . . . . 5 et 6 fr.
Vol. VI (*Rhynchophora*). . . . . 10 et 12 fr.
2e fascicule seul . . . . . 5 et 6 fr.
Catalogue raisonné *des Coléoptères du Nord de l'Afrique*, par L. Bedel, 1er fasc., pp. 1-208, in-8°, 1895-1900. . . . . 10 et 12 fr.
Mémoires entomologiques (*Études sur les Coléoptères*), par A. Grouvelle, fasc. 1 (1916), pp. 1-80. 3 et 4 fr.

Synopsis des Onthophagides d'Afrique, par H. d'Orbigny 20 et 25 fr.
Les zoocécidies du Nord de l'Afrique, par C. Houard . . 8 et 10 fr.

EXTRAITS DE *L'ABEILLE*

Catalogue syn. et géogr. des Coléoptères de l'Anc. Monde, par S. de Marseul, 1889, in-12 . . . . . 3 et 4 fr.
Catalogus Coleopterorum Europae et confinium, 1866, in-12. 0 fr. 50
Id. avec Index (*Suppl. au Catalogus*), 1877, in-12. 1 fr. 25
Les Entomologistes et leurs écrits, par de Marseul, in-12. 8 et 10 fr.
Etude sur les Malachides d'Europe et du bassin de la Méditerranée, par Peyron, 1877, in-12. . . . . 4 et 5 fr.
Mylabrides d'Europe (*Monogr. des*), par S. de Marseul, 1870, in-12, 2 planches coloriées : 5 et 6 fr.; noires : . . . . . 4 et 5 fr.

Silphides (*Précis des genres et espèces des*), par S. DE MARSEUL, 1884, in-12. . . . . 3 et 4 fr.

Tableaux synoptiques des Paussides, Clavigérides, Pselaphides et Scydmenides, par REITTER (trad. E. Leprieur), 1883, in-12. . . . . 3 et 4 fr.

Nouveau Repertoire contenant les descriptions des espèces de l'Ancien Monde, par S. DE MARSEUL :

Hydrocanthares Palpicornes, 1882, in-12. . . . . 3 et 4 fr.

Buprestides, 1889, in-12. . . . . 1 et 2 fr.

Oedémerides (*Synopse des*), par GANGLBAUER (traduction de Marseul), 1887, in-12. . . . . 1 et 2 fr.

Ditomides (*Monogr. des*), par P. DE LA BRULERIE, 1873, in-12. 2 et 3 fr.

Eumolpides (*Synopse des*), par E. LEFÈVRE (Appendice par DE MARSEUL), 1876, in-12. . . . . 1 et 2 fr.

Histérides de l'Archipel malais et indo-chinois, par S. DE MARSEUL, 98 p., 1864, in-12. . . . . 1 fr.

Magdalinus d'Europe et circa, par DESBROCHERS DES LOGES, 1870, in-12. . . . . 1 50 et 2 fr.

Nanophyes (*Monogr. du genre*), par H. BRISOUT DE BARNEVILLE, 1869, in-12. . . . . 1 50 et 2 fr.

Erotylides et Endomychides de l'Ancien Monde (*Revision des*), *d'après les travaux de M. E. Reitter*, 1889, in-12. . . 1 50 et 2 fr.

Claphyrus (*Monogr. du genre*), par HAROLD (traduction A. Preud'homme de Borre), 1870, in-12. . . . . 0 fr. 50

Oxyporus (*Tableau synopt. du genre*), par A. FAUVEL, 1864, in-12. . . . . 0 fr. 50

Malthinides de l'Ancien Monde (*Monogr. des*), par S. DE MARSEUL, 120 p., 1877, in-12. . . . . 3 et 4 fr.

Trichoptérygiens (*Synopse des espèces de*), par MATTHEWS 75 p., 1878, in-12. . . . . 3 et 4 fr.

Apionides (*Monographie des*), par WENCKER, 162 p., 1864, in-12 . . . . . 4 et 5 fr.

Téléphorides (*Monographie des*), par S. DE MARSEUL, 108 p., 1864, in-12. . . . . 3 et 4 fr.

EXTRAITS ET PUBLICATIONS DIVERSES

Revision des Coléoptères de l'Ancien Monde alliés aux Stenosis, par ED. REITTER, in-12, 50 p. (Extr. Gazette ent. Allem., XXX, 1866). . . . . 1 50 et 2 fr.

Le genre Aëpophilus, par V. SIGNORET, in-8°, 3 p., 1 pl. col. (Extr. Tijdschr. voor. Ent., vol. XXIII, 1879-80). 1 et 1 50

[Voir la suite à la page 6 de la couverture.]

AVIS TRÈS IMPORTANTS

Annales. — Le 1er trimestre des *Annales* de 1916 a paru le 9 mai.

Le Trésorier rappelle que le 1er trimestre des *Annales* de 1916 ne sera envoyé qu'aux membres de la Société qui auront payé la cotisation de l'année. Il prie donc ses collègues de se mettre en règle le plus tôt possible, en lui faisant parvenir leur cotisation.

Il est à leur disposition pour la recevoir tous les jours de semaine de 10 h. à midi, 17, quai Voltaire, Paris, VIIe, et à toutes les séances de la Société, 28, rue Serpente.

Les envois peuvent lui être faits soit à son domicile, 2, rue de La Planche, Paris, VIIe, soit au siège de la Société.

Tous les envois d'argent faits à la Société par lettres chargées, mandats-poste ou chèques payables à Paris, *doivent être libellés au nom de* **M. Ch. Lahaussois**, Trésorier, et non autrement, pour éviter les difficultés d'encaissement d'envois impersonnels.

L'Abeille. — Le 4e fascicule du vol. XXXI a paru le 22 avril 1914.

Avis. — La Bibliothèque de la Société est ouverte : pour renseignements, tous les jours, de 4 h. 1/2 à 6 h. 1/2; pour y travailler : les mardis, jeudis, samedis, de 3 h. à 6 h. 1/2, et les mercredis, de 8 h. à 10 h. 1/2 du soir.

PRÉPARATION D'INSECTES DE TOUS ORDRES

Étalage soigné de Lépidoptères, etc. — Entretien de collections et soufflage de chenilles. — Préparations microscopiques.

Mlle C. Bleuse, 29, rue Lacépède, Paris (Ve).

Envoi du tarif sur demande.

BULLETIN

DE LA

SOCIÉTÉ ENTOMOLOGIQUE DE FRANCE

Séance du 25 octobre 1916.

Présidence de M. J. de JOANNIS.

MM. le Dr René JEANNEL, Secrétaire, et Ch. DEMAISON (de Reims) assistent à la séance.

Nouvelles de nos collègues aux Armées. — Nous avons reçu de bonnes nouvelles du sergent P. DENIER, de l'Armée d'Orient, et nous avons eu le plaisir de voir, à leur passage à Paris, MM. G. BILLIARD, le capitaine P. BOPPE et le capitaine A. MAGDELAINE.

Admissions. — M. Paul VITTENET, ingénieur, chef de bataillon de réserve du génie, 28, rue Péclet, Paris (XVe). — *Entomologie générale, Biologie.*

— MM. Jean FAUVEAU, 1, rue Ozenne, à Toulouse (Hte-Garonne), et Georges MÉDAN, 47, rue Pharaon, à Toulouse, sont admis à titre d'assistants.

Présentation. — M. le Dr Vittorio RONCHETTI, médecin chef de l'hôpital principal, piazza Castello, 1, Milano (Italie), présenté par M. J. MAGNIN. — Commissaires-rapporteurs : MM. le Dr V. AUZAT et J. CLERMONT.

Inventaire des publications périodiques scientifiques. — L'Académie des Sciences a pris l'initiative de réunir, au moyen de quelques mesures pratiques, tous les renseignements relatifs aux séries de publications périodiques existant dans les Bibliothèques des grands Établissements scientifiques et des Sociétés savantes de Paris, afin de faciliter les recherches bibliographiques, de constater les lacunes à combler et d'éviter les doubles emplois.

Le Conseil de la Société, convoqué à cette occasion, a pris les dispositions nécessaires pour répondre à la demande de l'Académie des Sciences et lui assurer immédiatement son concours.

Observations diverses.

Remarques sur **Callimorpha quadripunctaria** var. **lutescens** [Lep.] *en Normandie.* — M. L. Demaison, qui a déjà parlé des conditions dans lesquelles il a trouvé cette variété en 1914 dans les Côtes-du-Nord, a constaté, cette année, sa prédominance en Normandie, à Saint-Pair (Manche).

Communications.

Note rectificative sur *Bombodes Vitalisi* Bourgoin et description d'une nouvelle espèce de *Bombodes*

[Col. Scarabaeidae]

par A. Bourgoin.

J'ai décrit sous le nom de *Bombodes Vitalisi* (*Bull. Soc. ent. Fr.* [1914], p. 352) deux *Bombodes* du Tonkin, l'un mâle, l'autre femelle, assez dissemblables par la coloration de leur pubescence; mais le dimorphisme sexuel est souvent très considérable chez les Macronotides, et je les avais considérés comme appartenant à la même espèce.

Un envoi, que j'ai reçu dernièrement, m'a mis en possession d'une femelle semblable au premier mâle, et d'un mâle semblable à la première femelle. Il y a donc là deux espèces distinctes. Je conserve le nom de *B. Vitalisi* au mâle décrit en 1914; quant à la femelle, je la rattache, sous le nom de *B. nigellus*, au mâle décrit plus loin.

La véritable femelle de *B. Vitalisi* ne diffère du mâle que par l'abdomen convexe, à ponctuation plus forte que chez le mâle, et par la large dent bifide qui termine extérieurement les tibias postérieurs, comme chez les autres femelles de *Bombodes*.

Bombodes nigellus, n. sp. — *B. ursi* Westw. *similis, sed minor. Niger, sat nitidus, hirsutus. Capite dense punctato, nigro-piloso, clypeo antice dilatato, leviter emarginato, angulis anticis rotundatis; thorace nigro, densissime punctato, nigro-piloso, postice medio vix pro-*

longato; scutello nigro, fortiter punctato, nigro-piloso; elytris nigris, dense punctatis, longius pilosis, pilis antice et postice nigris, in medio rufis; pygidio rufo-piloso. Subtus corpore nigro-brunneo, pectore lateribus flavo-pilosis; abdomine fulvo-piloso; tibiis tarsisque rufis, rufo-pilosis. — ♀ Abdomine convexo, tibiis posticis extus dente lato bifido armatis a mare differt.

Forme un peu plus large que celle de *B. Vitalisi*; aspect de *B. ursus* Westw., mais plus petit. Dessus entièrement couvert de pubescence dressée, noire, sauf sur le milieu des élytres, où elle forme une bande transversale rousse, étroite chez le mâle, plus claire et plus large chez la femelle. Sous cette pubescence, on distingue vaguement une petite tache squameuse jaunâtre entre la côte des élytres et leur bord externe. Propygidium et pygidium à pubescence rousse dressée. Dessous d'un noir brun, un peu moins foncé chez le mâle que chez la femelle, surtout sur l'abdomen. Épimères mésothoraciques et épisternes métathoraciques à longs poils jaunes; abdomen à pubescence latérale rousse, légèrement déprimé chez le mâle, convexe chez la femelle; cinquième arceau à pubescence rousse sur toute sa surface, très longue et très fournie chez le mâle, peu dense chez la femelle. Tibias rougeâtres, à pubescence rousse, dense chez le mâle; les intermédiaires bidentés extérieurement chez le mâle, tridentés chez la femelle, mais à dent supérieure à peine visible; tibias postérieurs, dans les deux sexes, avec deux longues épines terminales au bord interne et, chez la femelle, au bord externe, une longue et large dent bifide au sommet.

Longueur (du bord antérieur du pronotum à l'extrémité des élytres) ♂ 12,8 mm., ♀ 13 mm. — Largeur max. ♂ 7,2 mm., ♀ 7,5 mm.

Haut Tonkin : Chapa, mai 1916, 1 ♂; 1 ♀ sans localité (R. Vitalis de Salvaza, coll. A. Bourgoin.

Par sa coloration, cette espèce se rapproche beaucoup de *B. ursus* Westw., mais elle est plus petite. *B. ursus* n'a pas de pubescence jaune sur les côtés du pectus, ni de pubescence rousse sur le 5e segment ventral; de plus, les tibias intermédiaires de *B. ursus* sont triépineux latéralement et les deux épines situées vers leur milieu sont égales et très fortes dans les deux sexes, tandis que chez *B. nigellus* l'épine supérieure manque chez le mâle et est à peine visible chez la femelle.

Descriptions de deux espèces nouvelles d'*Elateridae* appartenant au genre *Dima* [Col.]

par E. Fleutiaux.

Le genre *Dima* a été introduit dans un tableau attribué à Eschscholtz et publié par Laporte de Castelnau dans ses « Études entomologiques » (ap. Silberm., Rev. entom., IV (1836), p. 4). Il a été depuis complètement décrit par E. Candèze, dans sa Monographie des Élatérides, IV, p. 237 (1863).

Jusqu'à présent, il ne comprenait que trois espèces originaires de l'Europe centrale et méridionale.

1. **Dima indica**, n. sp. — Oblong, assez convexe; d'un brun noirâtre brillant, pubescence jaune. Tête aplatie, inégale, ponctuée, plus densément en arrière; crêtes surantennaires saillantes. Labre transversal. Antennes dépassant la base du pronotum, brunes, à articles épaissis vers le bout. Pronotum aussi long que large, déprimé à la base, sinué sur les côtés, faiblement sillonné au milieu; ponctuation peu serrée, très espacée en arrière; angles postérieurs aigus, avec une carène prolongée le long du bord externe jusqu'au bord antérieur. Écusson plan. Élytres en ovale allongé, marqués de séries longitudinales de points formant des rangées régulières, mais non des stries profondes. Dessous de la même couleur; ponctuation un peu plus forte et plus écartée en avant qu'en arrière, serrée sur l'abdomen, surtout à l'extrémité. Pattes brunes, avec les tarses plus clairs. — Long. 9 mm.

Darjeeling.

Rappelle *D. Assoi* Per.; coloration plus foncée; angles postérieurs du pronotum plus saillants, plus aigus, ne portant pas de carène en dedans de la longue carène submarginale; élytres non striés, mais marqués de rangées régulières de points, bords latéraux indistinctement creusés en gouttière; partie élargie des hanches postérieures plus grande, échancrure plus anguleuse, partie externe faiblement élargie en dehors.

2. **Dima yunnana**, n. sp. — Oblong, convexe; d'un brun noirâtre, avec le pourtour du pronotum et des élytres, leur extrémité et la suture jaunes, pubescence jaunâtre, longue et hérissée. Tête aplatie, inégale et ponctuée. Antennes jaunes, dépassant la moitié du corps, à articles peu renflés au sommet. Pronotum aussi long que large, rétréci en arrière, sinué sur les côtés, déprimé à la base, noirâtre brillant bordé de jaune, espacément ponctué; bords latéraux saillants,

à carène submarginale entière, très près du bord et presque confondue avec lui; angles postérieurs aigus et divergents. Écusson arrondi et plan, entièrement jaune. Élytres ovales, convexes, noirs assez brillants, bordés de jaune latéralement et sur la suture, extrémité également jaune, fortement striés-ponctués surtout extérieurement; bord latéral tranchant. Dessous brun plus ou moins jaunâtre. Pattes assez longues, entièrement jaunes. — Long. 5,5-7 mm.

Yunnan.

Espèce remarquable par la convexité de son pronotum et de ses élytres et par la coloration générale.

Notes sur quelques *Prioninae* du Yunnan [Col. Cerambycidae]

par A. Lameere.

Macrotoma Fisheri C. O. Waterh. — Cette espèce n'habite pas seulement la Birmanie : je la connais maintenant aussi de Cochinchine, de Formose, du Yunnan et du Thibet. Elle varie du brun jaunâtre au noir de poix; la femelle de *Macrotoma* de l'Asie centrale que j'ai décrite sous le nom de *M. vidua*, est un individu très foncé du *M. Fisheri*, dont la femelle était restée inconnue jusqu'ici.

Prionus Gahani Lameere. — Je n'avais jamais vu de cet Insecte que deux mâles du Nord-Ouest de la Chine dans la collection du British Museum; M. P. Guerry m'en a communiqué une femelle provenant du Yunnan. Ce sexe a la poitrine entièrement glabre et la saillie intercoxale de l'abdomen large et arrondie, ce qui dénote des mœurs souterraines. Les tarses ne sont pas larges et courts comme chez le mâle, mais au contraire longs et grêles; la tête est bien moins forte; les antennes, beaucoup moins robustes, ont à peu près la même longueur, avec la même proportion dans les articles, mais le 12e article est coalescent avec le 11e, comme chez la femelle du *P. coriarius* L.

Prionus Delavayi Fairm. — Le Muséum de Paris possède maintenant un couple de cette espèce du Yunnan, qui m'était restée inconnue : l'insecte rapporté par Potanine du Sze-tchuan et que j'ai décrit comme *P. Delavayi*, en proposant de l'appeler *P. Potanini*, dans le cas où je ferais erreur, est absolument différent. Fairmaire ayant comparé son espèce au *P. brachypterus* Gebler, j'ai supposé que les tarses étaient les mêmes, Fairmaire ne parlant pas de ce caractère de

première importance : or, chez *P. Delavayi*, les tarses ont les lobes du 3e article tout à fait arrondis. L'espèce a la teinte et les sillons élytraux du *P. laminicornis* Fairm., dont elle diffère par ses antennes courtes et robustes, dépourvues des prolongements lamelliformes du sommet interne des articles; elle a la tranche externe des tibias postérieurs sillonnée comme chez *P. insularis* Motsch., dont elle se distingue, outre sa coloration claire, par le pronotum plus ponctué, les mandibules plus allongées, les antennes plus courtes, à articles plus dilatés au sommet chez le mâle, plus fortement dentés en scie chez la femelle, le 1er article n'atteignant pas le niveau du bord postérieur de l'œil; celui-ci est plus renflé; chez la femelle, le 12e article des antennes est coalescent avec le 11e.

Casiphioprionus limbatus Pic. — M. P. Guerry a eu l'amabilité de me communiquer le *type* de ce remarquable insecte du Yunnan; il appartient bien au groupe des *Anacolini*, comme l'a reconnu M. Pic (*L'Échange*, XXXII [1916], p. 2), et il vient se ranger dans la catégorie des *Closteri* près du genre *Psephactus* Harold, bien qu'il diffère de ce dernier par maintes particularités; la femelle, encore inconnue, est probablement très différente du mâle.

Casiphia thibeticola Fairm. — En même temps qu'il m'envoyait le *type* du genre *Casiphioprionus* Pic, M. P. Guerry m'adressait un *Prioninae* du Yunnan des plus curieux, qui ne peut être que le mâle du *Casiphia thibeticola* Fairm. décrit d'après une femelle de la collection de M. René Oberthür et que je n'ai pas pu voir.

A cause des yeux finement granulés, Fairmaire avait placé le genre *Casiphia* dans le groupe des Anacolides de Lacordaire; il décrit son insecte comme glabre et comme ayant la saillie intercoxale de l'abdomen arrondie en avant, c'est-à-dire avec les caractères d'un type à mœurs souterraines.

Or, le mâle que j'ai sous les yeux a, au plus haut degré, les caractères d'un *Prioninae* souterrain : il a le métasternum très ample, la poitrine et même la tête, le pronotum et l'écusson couverts d'une longue fourrure jaune; enfin la saillie prosternale est très élevée et prolongée en arrière par une protubérance en forme de lame de couteau ou de soc de charrue.

C'est bien le mâle du *Casiphia thibeticola* Fairm., car les yeux sont comme chez la femelle finement granulés, le prothorax court, à rebord latéral non anguleux, et les antennes de huit articles seulement, les trois derniers articles étant devenus coalescents.

Les yeux sont rapetissés, transversaux, embrassant à peine l'inser-

tion des antennes en dessous; les élytres, très larges aux épaules, vont en se rétrécissant en arrière; ils sont arrondis ensemble à l'extrémité qui est inerme, et longuement, mais faiblement, déhiscents à la suture. Les pattes sont longues et grêles; les fémurs postérieurs atteignent l'extrémité de l'abdomen; ils sont aplatis, mais à peine dilatés; les tarses ont le 1er article très long, plus long aux pattes postérieures que les deux suivants réunis.

Les antennes sont presque semblables à celles du genre *Sarmydus*, tout en ayant les articles plus étroits, plus allongés et dépourvus de saillies au sommet des articles; mais la proportion et la striation longitudinale de ceux-ci est la même.

Le genre *Casiphia* est donc très différent de *Casiphioprionus*, tout en appartenant au même groupe des *Closteri*, venant se ranger immédiatement après le genre *Sarmydus* Pascoe, dont j'ai décrit une espèce ayant les yeux finement granulés. Malgré ce dernier caractère, ni *Casiphia*, ni *Casiphioprionus* n'ont de parenté avec les *Anacoli* d'Amérique, et il est probable que le genre *Erythraenus* H. W. Bates, de Bornéo, que je ne connais pas, n'est pas non plus un *Anacoli*, mais bien un *Closteri*.

Sur quelques Diptères parasites

par le Dr J. Villeneuve.

1. Notre collègue M. J.-C. Nielsen, de Copenhague, a trouvé, dans le corps d'un *Harpalus* (*Pseudophonus*) *ruficornis* mort, quatre pupes de Diptères : deux seulement ont donné une éclosion, à savoir *Gymnopeza denudata* Zett. ♀ et *G. albipennis* Zett. ♂, qui ne sont que les deux sexes de la même espèce, comme le donnaient à penser les chasses antérieures de M. Nielsen.

G. denudata Zett. (qui est différent (1) de *G. denudata* sec. Brauer et Bergenstamm) paraît assez commun dans le Nord de l'Europe; il n'existe pas, que je sache, dans le bassin parisien; autrement on aurait pu supposer qu'il se rapporte à *Freraea gagathea* Rob.-Desv.

2. J'ai reçu, de notre collègue M. P. Dumée, des cocons de *Zygaena filipendulae* recueillis par lui à Montereau (Yonne). Plusieurs de ces cocons, parasités, m'ont donné en juillet-août un rarissime Tachinaire,

(1) Le genre *Gymnopeza* Zett. répond au genre *Gymnophania* Br.-Berg. En outre *G. denudata* Zett. = *G. albipennis* Zett. (ce dernier nom a la priorité).

Ceratochaeta setifacies Villen., dont je ne connaissais que le *type*, de Serres (Hte-Alpes), et un autre individu de la Lozère.

M. Dumée l'a encore obtenu, en 1915, de cocons de *Zygaena fausta* provenant également de Montereau.

Le capitaine Xambeu m'avait envoyé autrefois, des Pyrénées-Orientales, un individu de *Ceratochaeta prima* Br.-Berg., issu de *Zygaena fausta*. Enfin, dans un envoi récent, qui m'a été fait pour détermination par notre collègue M. C. Pierre, se trouvaient trois ♂ de *Tricholyga nova* Rond., sortis aussi de cocons de *Zygaena filipendulae*.

T. nova Rond. est également une espèce très rare : je ne l'avais vu jusqu'ici que du Morbihan. Il est voisin de *T.* (*Pokornyia*) *aberrans* Strobl (*deligata* Pand.), mais plus robuste et de taille un peu plus grande; il se différencie tout de suite par l'abdomen dont les segments II et III sont hérissés de soies fines discales assez courtes, dont quelques-unes, plus longues et plus fortes, sont de véritables macrochètes; le segment II n'a que 2 soies marginales médianes, le segment IV est couvert de soies robustes; la nervure transversale postérieure des ailes est droite.

3. Enfin, M. H. Sicard m'a fait parvenir plusieurs individus d'un Déxiaire méridional, *Gymnobasis microcera* Rond., parasites d'une Cétoine, et qu'il avait obtenus d'élevage (Lattes, près de Montpellier). Je ne puis donner à cette observation toute la précision désirable, notre collègue étant actuellement aux Armées.

Bulletin bibliographique

Anonyme : Verhandlungen der k. k. zool. botan. Gesellschaft in Wien. — Tables des vol. I-XXV. — Don de M. Donckier de Donceel.

Anonyme : List of publications of the Smithsonian Institution, July 1877. — Id.

Bergevin (E. de) et Sergent (E.) : A propos de l'hypothèse du goître endémique par un insecte piqueur. (*Bull. Soc. Path. exot.* IX [1916] 1 p.*

Bonnet (G.) : Mémoire sur la Puce pénétrante ou Chique. Paris 1867; 102 p., 2 pl. — Don de M. L. Bedel.

Brèthes (J.) : Hymenoptera paraguayensia (*Ann. Mus. Nac. Buenos-Aires*, XIX [1909] p. 225-256).*

Brèthes (J.) : Hymenópteros argentinos (*loc. cit.*) XX [1910], p. 205-316) fig.*

Id. : Dípteros nuevos ó poco conocidos de Sud-América (*loc. cit.* p. 469-484) fig.*

Id. : Descripcion de un nuevo genero y especie nueva de Chironomidae (*loc. cit.* XXII [1912] p. 451-453) fig.*

Id. : Descripción de un nuevo genero y especie de cochinilla de la República Argentina (*loc. cit.*, XXIII [1912], p. 279-281) fig.*

Id. : Himenópteros de la América meridional (*loc. cit.*, XXIV [1913], p. 35-166) fig.*

Id. Sur les formes sexuelles de deux Dolichodérines (*loc. cit.* XXVI [1914] p. 231-934) fig.*

Id. : Note sur quelques Dolichodérines Argentines (*loc. cit.* p. 93-96).*

Id. : Description d'un nouveau *Syrphidae* de la République Argentine (*loc. cit.* p. 97-98).*

Id. : Description de six *Cecidomyidae* de Buenos-Aires (*loc. cit.* p. 151-156) fig.*

Id. : Contribution à l'étude des *Pepsis* (*loc. cit.* p. 235-355, pl. 9-10).*

Id. : Descripcion de un genero nuevo y una nueva especie de Tisanóptero de la Republica Argentina (*loc. cit.* XXVII [1915], p. 89-92) fig.*

Id. : Un nouvel Orthoptère de la République Argentine (*loc. cit.* p. 333-334).*

Id. : A propósito de la nota del Doctor F. Lahille sobre *Prospaltella Berlesei* How. (*loc. cit.*, p. 353-358).*

Id. : Hyménoptères parasites de l'Amérique méridionale (*loc. cit.* p. 401-430) fig.*

Id. : Descripcion de una nueva mosca langosticida (*loc. cit.* XXVIII [1916] p. 141-144) fig.*

Id. : Algunas notas sobre mosquitos argentinos (*loc. cit.*, p. 193-218) fig.*

Id. : Une nouvelle espèce de Diptère pupipare du Chili. — Quelques *Ichneumonidae* nouveaux des provinces d'Alconcagua et Tacua. (*Bol. Mus. Nac. Buenos-Aires*, 1913, p. 1-7) fig.

Brèthes (J.) : Description d'un *Braconidae* et d'un *Proctotrupidae* du Chili (*Anales Zool. apl.* II [1915] p. 13-14) fig.*

Id. : Quelques nouveaux Céropalides du Musée de San Paulo (*Rev. Mus. Paulista*, VIII [1910] p. 64-70).*

Id. : Description d'un *Pandeleteius* (Curcul.) nouveau de Buenos-Aires (*Physis*, I [1913] p. 192-193).*

Id. : Notas entomológicas (*loc. cit.*, p. 583-584).*

Id. : El *Anopheles albitarsis* F. Lch. A. (*loc. cit.* II [1916] p. 175-177).*

Id. : Description d'un nouveau *Chironomidae* du Chili (*Rev. Chil. Hist. Nat.* XVII [1913] p. 19-20) fig.*

Id. : Description d'un nouvel Hyménoptère du Chili (*loc. cit.*, p. 34).*

Id. : Description d'un nouveau Curculionide du Chili (*loc. cit.*, p. 39). fig.*

Id. : Description d'un nouveau genre et d'une nouvelle espèce de *Ptiliidae* du Chili (*loc. cit.* XIX [1915] p. 15-17) fig.*

Id. : Sur la *Prospalangia platensis* (n. g., n. sp.) et sa biologie (Hym.) (*An. Soc. cient. Argent.* LXXIX [1915], p. 314-320) fig.*

Id. : Las plagas de la agricultura Nos 1 et 2 [1913] p. 1-25.*

Id. : Les ennemis de la *Diaspis pentagona* dans la République Argentine. (*Nunq. Otiosus* [1914] p. 1-16) fig.*

Id. : Notes synonymiques sur quelques insectes argentins. (*Bull. Soc. ent. Fr.* 1914, p. 58-59).*

Id. : Une nouvelle espèce d'*Ulidinae* du Tucuman (*loc. cit.*, p. 87-88) fig.*

Brögger (W.-C.) : Ueber die Ausbildung des Hypostomes bei einigen skandinavischen Asaphiden. (*Bihang K. Svenska Vet.-Akad. Handl.*, XI [1886], 3), 78 p., 3 pl. — Don de M. L. Bedel.

Cecconi (G.) : Manuale di Entomologia forestale, fasc. 4, p. 193-256, fig. 236-307.*

Champion (G.-C.) : On new or little-known Xylophilidae (*Trans. ent. Soc. London*, 1916, p. 1-64, pl. 1-2.)*

Id. : Notes on Melandryidae. (*Ent. Mont. Mag.* (3) II [1916], p. 1-10, 32-40, 52-83, 99-108, 144-157; pl. 2.)*

CHAMPION (G.-C.) : On some weevils attacking orchids (*loc. cit.*, p. 200-202.)*

ID. : Notes on Melandryidae (4.) Supplementary note and correction (*loc. cit.*, p. 224-226.)*

CULOT (J.) : Noctuelles et Géomètres d'Europe. 1re partie : Noctuelles II, 38-39, p. 177-200, pl. 73-76.*

DELAMOTTE (D.-E.) : Monographie du *Phylloxera vastatrix*. Alger, 1885, 268 p., 6 pl. — Don de M. L. Bedel.

DOGNIN (P.) : Hétérocères nouveaux de l'Amérique du Sud. Fasc. IX, 17 p.*

GROUVELLE (A.) : Description de Clavicornes nouveaux de la République Argentine. (*Rev. Mus. La Plata*, XXIII, p. 234-256.*

HUSTACHE (A.) : Diagnoses de *Ceuthorrhynchini* recueillis par MM. Alluaud et Jeannel dans l'Afrique Orientale. (*Bull. Soc. ent. Fr.* 1916, p. 168-170).*

LAMEERE (A.) : Les caractères sexuels secondaires des Prionides. (*Bull. Soc. Fr. Belg.*, XLIX (1816), p. 1-14.*

ID. : Une théorie zoologique (*loc. cit.*, p. 378-441).*

ID. : *Trictenotomidae* de la collection du Muséum de Paris. (*Bull. Mus. Hist. nat.* [1916], p. 84-91).*

ID. : Conférence sur les mœurs sociales des animaux. (*Bull. Inst. génér. psychol.*, XVI [1816], p. 1-17.)*

PIONNEAU (P.) : Sur les espèces du genre *Carpocoris* Kolen. et leur répartition géographique dans l'Europe centrale. (*Misc. ent.*, XXIII), 5 p.*

VIALLANES (H.) : Ganglion optique de larves de Diptères. (*Soc. philom. Paris*, 1885), 8 p. — Don de M. L. Bedel.

ID. : Ganglion optique de la Libellule. (*Ann. Sc. nat., Zool.*, XVIII, p. 1-34, pl. 14-16). — Id.

Entomologist (*The*), XLIX, 1916. — ROWLAND-BROWN (H.) : Note on a species of Lycaenid new to the palearctic lepidopterous fauna, *Agriades aragonensis* Verity ; p. 169. — ID. : Notes on some spring and autumn butterflies of Cannes and the Neighbourhood ; p. 175 et

195. — Id. : *Callophrys airo* at Cannes; p. 187 et 208. — Id. : *Agriades corydon* var. *syngrapha*, and *Melanargia galathea* in the Bucks; p. 209. — Id. : French entomologists at the front; p. 209. — Harrison (J.-W.-H.) : Coccidae and Aleyrodidae in Northumberland, Durham and northeast Yorkshire; p. 172. — Elliott (E.-A.) : A puzzle in the nomenclature of the Hymenopterous family Stephanidae Leach; p. 174. — Wileman (A.-E.) et South (R.) : New species of Lepidoptera from Formosa; p. 178 et 201. — Theobald (F.-V.) : Notes on new or little known British Aphides, II; p. 182, fig. — Lyle (G.-T.). : Contributions to our knowledge of the British Braconidae; p. 185 et 206. — Nash (W.-G.) : *Agriades corydon* attacked by a bug, *Zicrona caerulea* L.; p. 210. — Reid (P.-C.) : Larval stage of *Hepialus humuli*; p. 188. — Id. : Early emergence of *Bomolocha frontis* (*crassalis*); p. 190. — Id. : Abundance of spring larvae; p. 191. — Jex Long (W.-A.-R.) : *Vanessa antiopa* in Scotland; p. 188. — Gillett (F.-M.) : On rearing *Callimorpha dominula*; p. 189. — Id. : Oviposition of *Cerura furcula*; p. 189. — Thurnall (A.) : *Chrosis littoralis* Curt. at Wanstead; p. 190. — Id. : *Biston betularius*, v. *doubledayaria* at Wanstead; p. 208. — Id. : *Ypsolophus marginellus* F. in Essex; p. 211. — South (R.) : *Ancylis upupana* and *Pammene germarana*, etc., in the New Forest; p. 190. — Id. : Larvae of *Polyploca* (*Cymatophora*) *ridens* in the New Forest; p. 190. — Id. : Tabanidae in the New Forest; p. 191. — Hartley (G.-E.) : *Acronycta aceris* in Aberdeenshire (a correction); p. 191. — Adkin (R.) : A plague of caterpillars; p. 191. — Bramwell (F.-G.-S.) : *Sphinx convolvuli* in Sussex; p. 192 et 212. — Saunders (W.) : A spider's sagacity; p. 192. — Sheldon (W.-F.) : *Agriades Corydon* Poda and Dr Verity's discovery; p. 193. — Girault (A.-A.) : A new genus of Scelionidae from the West Indies; p. 198 — Id. : A new genus of Ophioneurine Trichogrammatidae from Java; p. 199. — Distant (W.-L.) : On the Cicadidae found in the Philippine islands; p. 203. — Lucas (W.-J.) : British Odonata in 1915; p. 204. — Kershaw (G.-B.) : A plague of caterpillars; p. 210. — Newnham (F.-B.) : *Agriades Corydon* in Shropshire; p. 211. — Bury (H.) : Tabanidae in the New Forest; p. 212. — Brown (J.-W.) : Lepidoptera at the front; p. 212.

Entomologist's Monthly Magazine (*The*), LII, 1916. — Sharp (D.) : Studies in *Helophorini* (suite); p. 169 et 193, pl. 3-6. — Id. : Diagnosis of a new species of *Bibloplectus* (Pselaph.); p. 177. — Id. : Additional British species of *Ernobius*; p. 178. — Meyrick (E.) :

Note on some fossil insects; p. 180. — MOULTON (J.-C.) : Mr. Druce's criticisms, and an appeal; p. 182. — CHAMPION (G.-C.) : Note on the Curculionid-genus *Mascarauxia* Desbr.; p. 185. — ID. : On some weevils attacking orchids; p. 200. — BRITTEN (H.) : *Trinodes hirtus* F., in Oxfordshire; p. 185. — ID. : *Ischnomera sanguinicollis* F., in Oxfordshire; p. 186. — BLACK (J.-E.) : *Deleaster dichrous* Grav., in Roxburgshire; p. 186. — WALKER (J.-J.) : *Notochilus limbatus* Fieb., in the New Forest; p. 186. — ID. : Occurrence of *Somotrichus* (*Lebia*) *elevatus* F.. in Cheshire; p. 203. — ID. : *Euconnus Mäklini* Mannh. in the Oxford district; p. 204. — CHAPMAN (T.-A.) : A plague of caterpillars; p. 186. — ID. : *Vespa norvegica* at Reigate; p. 187. — ID. : A plague of caterpillars —? *Vanessa urticae*; p. 207. — NICHOLSON (G.-W.) : *Otiorrhynchus porcatus* Herbst, in Ireland; p. 202. — DONISTHORPE (H.-S.-J.) : *Psylliodes cyanoptera* Ill. ab. *tricolor* Weise, new to Britain; and notes on species as British; p. 204. — BAYFORD (E.-G.) : *Leptura sanguinolenta* L., at Barnsley; p. 205. — DAY (F.-H.) : Field note on *Corymbites pectinicornis* L.; p. 205. — COLLINS (J.) : *Ocypus cyaneus* Payk., in the Oxford district; p. 205. — SCOTT (H.) : Another Staphylinid parasitic on a Dipteron; p. 206. — CAMERON (M.) : Note on *Tanygnathus terminalis* Er.; p. 206. — PORRITT (G.-T.) : Black pupae of *Abraxas grossulariata*; p. 206. — SICH (A.) : Colour of Stigmellid larvae; p. 207. — GREEN (E.) : The rhododendron Tingid (*Stephanitis rhododendri* Horv.) in Surrey; p. 207. — PEARCE (E.-K.) : *Chrysops sepulchralis* F., and *Anthrax fenestratus* Fln., in Dorsetshire; p. 208. — PERKINS (R.-C.-L.) : *Nomada ruficornis* (sensu lato) and its close allies; p. 210.

Entomologist's Record and Journal of Variations (*The*), XXVII [1916], p. 7-9. — BURR (M.) : A note on *Dinarchus dasypus* Ill.; p. 145. — ID. : Field notes from Salonika; p. 189. — TURNER (H.-J.) : Nomenclature; p. 146. — ID. : Bibliography of *Pieris napi*, its forms and close allies; p. 156. — ID. : The upper Engadine in 1914; p. 151. — ID. : *Brenthis pales*, its history and its named forms; p. 160. — BURROWS (C.-R.-N.) : The time of emergence of lepidopterous imagines; p. 148. — DONISTHORPE (H.) : *Cis dentatus*, Mellié, not a British insect; p. 155. — BAGNALL (R. S.) : Records on som new British plant-galls. II. Some more Cecidomyid galls; p. 158. — VERITY (R.) : British race of Butterflies : their relationships and nomenclature; p. 165. — CHAPMAN (T.-A.) : Birds and Butterflies; p. 174. — ID. : Period of incubation of *Ægeria apifor-*

mis; p. 128. — Sich (A.) : Food of the larva of *Diplodoma herminiata* Tutt; p. 174. — Id. : Three weeks at Torquay; p. 210. — Raye (W.-J.) : New forms of *Heliconius*; p. 194. — Bagnall (R.-S.) et Harrison (J.-W.) : Records of some new British plant-galls; p. 197. — Wheeler (G.) : Attacks by birds on butterflies; p. 204. — Id. : The carrying habits of the sexes in paired butterflies; p. 204. — Id. : *Pararge megaera* in Surrey; p. 204. — Muschamp (P.-A.-H.) : Olla podrida; p. 205. — Metcalfe (J.-W.) : *Pselnophorus brachydactyla* in Glowcestershire; p. 205. — Buxton (D.-A.-J.) : Lepidoptera at the Dardanelles; p. 213. — Parkinson Curtis (W.) : The colouration problem; p. 217. — Prout (E.-B.) : *Boarmia rhomboidaria* ab. *Rebeli* under an alias; p. 220. — Hallett (H.-M.) : Hymenoptera aculeata at Porthcawl; p. 221. — Lowe (F.-E.) : *Acidalia congruata* at Geneva; p. 221.

Real Sociedad Española de Historia Natural (*Boletin*), XVI [1916]. 3-6. — Dusmet y Alonso (J.-M.) : Noticia de lo publicado en 1915 sobre entomologia de España y sus colonias; p. 163. — Bolivar y Pieltain (C.) : Notas sobre Eumastacinos (Orth.); p. 196. — Id. : Exploración entomológica de algunas cuevas de la región cantábrica; p. 315. — Bolivar (J.) : Los crustáceos de las Baleares; p. 246.

Royal Dublin Society. 1° Economic Proceedings II, 10-11, 1915-1916.⊙

— 2° *Scientific Proceedings*, XIV, 24-41, 1915 et XV, 6-14, 1916.⊙

Royal Society of London (*Philosophical Transactions*), B. 342-351, 1916.⊙

Royal Society of New South Wales (*Journal and Proceedings*), XLIX, 4, 1916.⊙

Secretaria de Fomento, Colonizacion e Industria. Mexico. Boletin de la Direccion de Estudios Biologicos, I [1916], 4. — Herrera (M.) : La inteligencia y el instinto de los insectos; p. 389, pl. 1.

Sociedad Aragonesa de Ciencias Naturales (*Boletin*), XV [1916], 5-7. — Lacroix (J.) : Notes névroptérologiques; p. 149, fig.

Sociedad Cientifica « Antonio Alzate » (*Memorias y Revista*), XXXII, [1915], 11-12. — Gandara (G.) : Un parasite nouveau du maguey; p. 483, fig.

— Id. XXXIV, 4-9, 1916.⊙

Société d'Histoire Naturelle de l'Afrique du Nord (*Bulletin*), VII [1916], n° 4. — Bezzi (M.) : Sur un genre nouveau de Diptère subaptère des cavités souterraines du Djurdjura; p. 90, tab. 3 et fig.

South African Museum (*Annals*), XIV, 2, 1916. — Arnold (G.) : A monograph of the Formicidae of South Africa (*Ponerinae, Dorylinae*), p. 159, pl. 2-4.

— XV, 4, 1916. — Barnard (K.-H.) : Contributions to the Crustacean fauna of South Africa; p. 105, pl. 26-28.

South London Entomological and Natural History Society (*Proceedings*), [1915-1916]. — Dixey (T.-A.) : Seasonal dimorphism; p. 1. — Sich (A.) : Life-cycle of *Tortrix viridana*; p. 15. — Bunnett (E.-J.) : The maple Aphis and its dimorphic larva; p. 21, pl. 4. — Sano (C.) : On the metamorphosis of *Geotrupes stercorarius*; p. 25, pl. 5. — Lucas (W.-J.) : British cockroaches; p. 29, pl. 3. — Id. : British crickets; pl. 6. — Platt Barrett (J.) : The European species of the genus *Melanargia*; p. 55, pl. 12. — Adkin (R.) : The autumn butterflies at Eastbourne and some other notes; p. 62. — Id. : The Lachneides; p. 96, 101, 107.

Tijdschrift voor Entomologie, [1916]. — Roepke (W.) : Ueber einige weniger bekannte kulturschädliche Lepidopteren aus Java; p. 1, pl. 1-6. — Oudemans (A.-C.) : Notizen über Acari, n° 24; p. 18, fig. — Meijere (J.-C.-H. De) : Zur Zeichnung des Insekten, im besonderen des Dipteren- und Lepidopterenflügels; p. 55.

U. S. Department of Agriculture. — 1° *Bulletin.* — 351. Simanton (F.-L.) : The terrapin scale : an important enemy of peach orchards; 96 p., fig. 3, pl. — 352. Cushman (R.-A.) et Isely (D.) : The cherry leaf-beetle, a periodically important enemy of cherries; 28 p., fig., 5 pl. — 358. Howe (R.-W.) : Studies of the Mexican cotton boll weevil in the Mississipi valley; 32 p., fig. — 363. Chittenden (F.-H.) : The pink corn-worm : an insect destructive to corn in the crib; 20 p., fig., 3 pl.

2° *Journal of Agricultural Research* (*Reprint from*). — V, 25. Pierce (W.-D.) : A new interpretation of the relationships of temperature and humidity to insect development; p. 1183-1191. — VI, 2. — Miller (J.-M.) : Oviposition of *Megastigmus spermotrophus* in the seed of Douglas fir; p. 65-68, pl. 5-7. — VI, 3. Coad (B. R.)

et Howe (R.-W.) : Insect injury to cotton seedlings; p. 129-139, pl. 12-16. — VI, 5 : Simanton (F.-L.) : *Hyperaspis binotata,* a predatory enemy of the terrapin scale; p. 197-203, pl. 24-25. — VI, 7, K-32. Snyder (T. E.) : Egg and manner of oviposition of *Lyctus planicollis*; p. 273-276, pl. 28-31. — VI, 7 K-31. Back (E.-A.) et Pemberton (C.-E.) : Effect of cold storage temperatures upon the pupae of the Mediterranean fruit fly; p. 251-260. — Baker (A. C.) et Davidson (W. M.) : Woolly pear Aphis; p. 351-360, fig. — Packard (C. M.) : Life histories and methods of rearing Hessian-fly parasites; p. 367-381, pl. 51-52. — Runner (G.-A.) : Effet of Röntgen rays on the tobacco, or cigarette beetle and the results of experiments with a new form of Röntgen tube; p. 383-388. — Tower (D.-G.) : Comparative study of the amount of food eaten by parasitized and non parasitized larvae of *Cirphis unipuncta*; p. 455-458. — Quaintance (A.-L.) et Baker (A.-C.) : Aleyrodidae, or white flies attacking the orange, with descriptions of three new species of economic importance; p. 459-472, pl. 64-69.

A. B.

Le Secrétaire-gérant : L. Chopard.

VOYAGE DE CH. ALLUAUD ET R. JEANNEL
en Afrique Orientale (1911-1912)

Mémoires parus :

Liste des Stations : par Ch. ALLUAUD et R. JEANNEL, avec une carte.

Grottes de l'Afrique Orientale : par Ch. ALLUAUD et R. JEANNEL.

Crustacés : I, *Phyllopoda*, par E. DADAY DE DEÉS. — II, *Amphipoda*, par E. CHEVREUX.

Arachnides : I, *Opiliones*, par le Dr C.-Fr. ROEWER, avec 1 pl. n. — II, *Ixodidae*, par L.-G. NEUMANN. — III, *Araneae* (1re partie), par L. BERLAND.

Hémiptères : I, *Pentatomidae*, par le Dr R. JEANNEL, avec 4 pl. n. — II, *Naucoridae*, *Belostomidae* et *Nepidae*, par A.-L. MONTANDON.

Strepsiptères : par le Dr R. JEANNEL, avec 1 pl. n.

Coléoptères : I, *Pselaphidae*, par A. RAFFRAY. — II, *Onthophagini*, par H. D'ORBIGNY. — III, *Meloidae*, par M. PIC, avec 1 pl. col. — IV, *Hylophilidae* et *Anthicidae*, par M. PIC, avec 1 pl. n. — V, *Hybosorinae*, etc., par E. BENDERITTER, avec 1 pl. n. — VI, *Buprestidae*, par Ch. KERREMANS, avec 1 pl. col. — VII, *Lampyridae*, par E. OLIVIER. — VIII, *Hispinae*, par R. GESTRO, avec 1 pl. n. — IX, *Dascillidae*, etc., par M. PIC. — X, *Anthribidae*, par K. JORDAN. — XI, *Histeridae*, par H. DESBORDES. — XII, *Dynastinae*, par E. BENDERITTER, avec 1 pl. n.

Hyménoptères : I, *Proctotrupidae*, *Cynipidae*, etc., par J.-J. KIEFFER. — II, *Formicidae*, par le Dr F. SANTSCHI, avec 2 pl. n. — III, *Chrysididae* et *Vespidae*, par R. DU BUYSSON. — IV, *Braconidae*, par GY. SZÉPLIGETI.

Diptères : I, *Chironomidae* et *Cecidomyidae*, par J.-J. KIEFFER. — II, *Nematocera*, par F.-W. EDWARDS. — III, *Polyneura*, par P. RIEDEL. — IV, *Anthomyiidae*, par P. STEIN. — V, *Brachycera*, par Th. BECKER, avec 2 pl. n.

Lépidoptères : I, *Chenilles des galles*, par F. LE CERF, avec 2 pl. n.

Orthoptères : I, *Dermaptera*, par A. BORELLI, avec 2 pl. n. — II, *Mantidae*, par L. CHOPARD.

Pseudonévroptères : I, *Termitidae*, par V. SJÖSTEDT. — II, *Odonata*, par R. MARTIN, avec 3 pl. n.

Névroptères : *Planipennia*, etc., par L. NAVÁS.

Myriapodes : I, *Chilopoda*, par H. RIBAUT, avec 5 pl. n. — II, *Symphyla*, par H. RIBAUT, avec 2 pl. n.

Plancton du Victoria-Nyanza, par J. VIRIEUX, avec 2 pl. n.

Vers : *Turbellariés*, *Trématodes* et *Gordiacés*, par P. DE BEAUCHAMP, avec 1 pl. n. — II, *Oligochètes*, par MICHAELSEN, avec 1 pl. n.

Poissons du Victoria-Nyanza, par le Dr J. PELLEGRIN, avec 1 pl. n.

Pour tous renseignements concernant cette publication s'adresser, provisoirement, à M. Ch. ALLUAUD, rue du Dragon, n° 3, Paris (VIe).

Characters of undescribed Lepidopteru heterocera, par F. WALKER. London, 1869, in-8° . . . . . 3 et 4 fr.

Tableaux analytiques pour déterminer les Coléoptères d'Europe, in-8°, Moulins. (Extr. Rev. sc. Bourb.) :

I. *Nécrophages*, traduit de REITTER [par M.-J. BELON], 1890. . . . . 1 fr.

II. *Colydiides, Rhysodides, Trogositides* (traduit de REITTER), 1891. . . . . 0 fr. 50

Histérides nouveaux (Description d'), par S. DE MARSEUL, in-8° (Extr. Ann. Soc. ent. Belg.). . . . . 1 50 et 2 fr.

Monographie de la famille des Eucnémides, par H. DE BONVOULOIR, Paris, Soc. ent. Fr., in-8° avec 42 planches gravées. . . . . 5 et 7 fr.

Essai sur la classification des Pyralites, par E.-L. RAGONOT, in-8°, 276 p., 4 pl. color. (Extr. Ann. Soc. ent. Fr. 1890). . . . . 10 et 12 fr.

Le même, pl. noires. . . . . 4 et 6 fr.

Nouveaux genres et espèces de Phycitinae *et* Galleriidae, par E.-L. RAGONOT, in-8°, 52 p. (Extr. Ann. Soc. ent. Fr. 1888). . . . . 3 et 4 fr.

Notes synonymiques sur les Microlépidoptères et description d'espèces peu connues ou inédites, par E. L. RAGONOT, in-8°, 66 p., 1 pl. color. (Extr. Ann. Soc. ent. Fr. 1894). . . . . 4 et 5 fr.

Microlépidoptères de la Haute Syrie récoltés par M. Ch. Delagrange, par E.-L. RAGONOT, in-8°, 15 p. (Extr. Ann. Soc. ent. Fr. 1895). . . . . 1 50 et 2 fr.

Diagnoses of North American Phycitidae and Galleriidae, by E.-L. RAGONOT, Paris, 1887, in-8°, 20 p . . . . . 1 50 et 2 fr.

Revision of British species of Phycitidae and Galleriidae, by E.-L. RAGONOT, in-8°, 58 p. . . . . 2 fr. et 2 50

Catalogue des Phycitinae, par E.-L. RAGONOT, in-4°, 52 p. (Extr. de la Monogr. des Phycitinae, 1893) S. l. n. d. 5 et 6 fr.

Genera et Catalogue des Psélaphides, par A. RAFFRAY, in-8°, 621 p., 3 pl. (Extr. des *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1903). 20 et 25 fr.

Pour les *Membres* de la Société, les offres d'échanges, demandes de communications ou de renseignements d'ordre *purement scientifique*, qui n'excéderont pas *cinq* lignes, seront insérées *gratuitement* dans deux numéros; lorsque ces offres ou demandes n'excéderont pas *dix* lignes, elles coûteront 0 fr. 20 la ligne pour deux numéros.

La Société entomologique de France tient ses séances les 2e et 4e mercredis de chaque mois (excepte août et septembre), à 8 h. 1/2 du soir, au siège social, Hôtel des Sociétés savantes, 28, *rue Serpente*.

Elle publie :

1° Les Annales de la Société entomologique de France (4 fascicules par an avec planches et figures);

2° Le Bulletin de la Société entomologique de France (21 numéros par an avec figures).

Les Membres résidant en France, dans les pays de protectorat ou les colonies françaises, paient une cotisation annuelle de. . . . . 25 fr.

Les Membres résidant à l'Étranger paient. . . . . 26 fr.

La Société admet des assistants (entomologistes âgés de moins de 21 ans) qui paient une cotisation annuelle de. . . . . 5 fr.

Tout Membre payant une somme de 300 francs est nommé Membre à vie. Il n'a plus de cotisation à payer, reçoit *franco* les *Annales*, le *Bulletin*, et, *à titre de prime gratuite*, une série de dix volumes des *Annales* parmi ceux à *prix réduit* restant encore en magasin.

Ce versement de 300 francs peut s'effectuer par fractions annuelles et consécutives d'au moins 100 francs.

La Bibliothèque (28, rue Serpente) est ouverte aux Sociétaires les *mardis*, *jeudis* et *samedis*, de 3 heures à 6 heures 1/2; le *mercredi*, *de* 8 *à* 10 *heures* 1/2 *du soir*.

PROPRIÉTÉS DE LA SOCIÉTÉ

L'ABEILLE, Journal d'Entomologie, fondé par S. DE MARSEUL, continué par la Société entomologique de France, publie spécialement des travaux sur les COLÉOPTÈRES de l'Ancien Monde.

M. L. BEDEL, *20, rue de l'Odéon*, est chargé de la publication du Journal (*examen et admission des mémoires et correspondance scientifique*).

Le montant des abonnements L'Abeille (à 10 fr. ou 12 fr. *par volume*) doit être adressé à M. J. MAGNIN, Bibliothécaire adjoint de la Société entomologique, *28, rue Serpente*.

COLLECTIONS

Collection H. Sénac (*Tenebrionidae paléarctiques*),
Collection Ch. Brisout de Barneville (*Coléoptères paléarctiques*),
Collection Vauloger (*Anthicidae*, *Malachiidae*, *Erodiidae*),
chez M. L. BEDEL, 20, rue de l'Odéon;

Collection H. de Peyerimhoff (*Microlépidoptères*),
Collection H. Brisout de Barneville (*Coléoptères d'Europe*),
Collection Aubé (*Coléopteres paléarctiques*),
Collection Capiomont (*Hyperidae*, *Lixus*, *Larinus*),
Collection Vauloger (*Helopidae*).
Collection complète des Orthoptères de France, don Finot,
Collection d'Hémiptères de France, don Fairmaire,
Collection Pandellé (*Diptères de France*),
Collection de Diptères de France, don de M. le Dr Gobert,
Collection A. Cheux (*Lépidoptères de France*),
Collection entomologique française de tous les ordres,
Collection d'exemplaires *typiques*,
au Siège social, 28, rue Serpente.

SOMMAIRE DU N° 16

Séance du 25 octobre 1916

Nouvelles de nos collègues aux Armées. — Admissions. — Présentation. — Inventaire des publications périodiques scientifiques. 253

Observations diverses.

Remarques sur *Callimorpha quadripunctaria* var. *lutescens* [Lep.] en Normandie. 254

Communications

A. Bourgoin. — Note rectificative sur *Bombodes Vitalisi* Bourg. et description d'une nouvelle espèce de *Bombodes* [Col. Scarabaeidae]. 254

E. Fleutiaux. — Descriptions de deux espèces nouvelles d'*Elateridae* appartenant au genre *Dima* [Col.] 256

Aug. Lameere. — Notes sur quelques *Prioninae* du Yunnan [Col. Cerambycidae] 257

Dr J. Villeneuve. — Sur quelques Diptères parasites. . . . 259

Bulletin bibliographique. 260

Pour la *correspondance scientifique*, les *réclamations* et les annonces s'adresser à :

M. le Secrétaire de la Société entomologique de France

28, rue Serpente, Paris, 6e.

TYPOGRAPHIE FIRMIN-DIDOT ET Cie. — PARIS.